

Yleisimpien lääkkeiden ja alkoholin yhteiskäyttö



- Pääsääntöisesti lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutukset ovat lieviä. Samanaikainen käyttö voi kuitenkin lisätä haittavaikutuksia.
- Kaikki keskushermostoa lamaavat lääkkeet, kuten unilääkkeet, voivat aiheuttaa jopa kuolettavia vaaratilanteita alkoholin kanssa samanaikaisesti käytettynä.
- Naisille ja iäkkäille haittavaikutukset ilmaantuvat herkemmin kuin miehille.

1. Lääkkeitä, joita **EI SAA KÄYTTÄÄ** alkoholin kanssa



VAIKUTTAVA AINE	KAUPPANIIMI (esim.)	KÄYTTÖ (esim.)	HAITTA-VAIKUTUKSET
disulfiraami*	Antabus	alkoholiriippuvuus	
metronidatsoli**	Flagyl, Trikozol, Metronidazol, Helipak	bakteeri-infektiot, loisten häätö	antabusreaktio: kasvojen punoitus, päänsärky, kuumotus, verenpaineen lasku, oksentelu
tinidatsoli***	Fasigyn	bakteeri-infektiot, loisten häätö	

* Disulfiraamin käytön lopettamisen jälkeen tulee alkoholia välttää jopa 2 viikon ajan.

** Metronidatsolin käytön lopettamisen jälkeen tulee alkoholia välttää vähintään 48 tunnin ajan.

*** Tinidatsolin käytön lopettamisen jälkeen tulee alkoholia välttää vähintään 72 tunnin ajan.

2. Lääkkeitä, joita **EI PIDÄ KÄYTTÄÄ** alkoholin kanssa (aiheuttavat erityisen riskin)

LÄÄKEAINE- RYHMÄ	VAIKUTTAVA AINE (esim.)	KAUPPANIMI (esim.)	HAITTA- VAIKUTUKSET
Unilääkkeet	midatsolaami, tsolpideemi, tsopikloni, tematsepaami	Dormicum, Stilnoct, Imovane, Tenox	keskushermostolama, hengityslama, liikenne- riskit, alkoholi voi häiritä unenlaatua
Rauhoittavat lääkkeet	oksatsepaami, diatsepaami, loratse- paami, hydroksitsiini	Opamox, Diapam, Temesta, Atarax	keskushermostolama, hengityslama, liikennriskit
Opioidit	kodeiini, tramadoli, buprenorfiini, fenta- nyyli, oksikodoni	Panacod, Codesan Comp, Tramal, Norspan, Durogesic, Oxynorm	keskushermostolama, hengityslama, liikennriskit
Epilepsialäk- keet, hermo- kipulääkkeet	natriumvalproaatti, klobatsaami, pregabaliini	Absenor, Deprakine, Frisium, Lyrica	keskushermostolama, hengityslama, liikennriskit
Lihäs- relaksantit	titsanidiini, orfenadriini	Sirdalud, Norflex	keskushermostolama, hengityslama, liikennriskit
Kipulääke	parasetamoli	Para-Tabs, Panadol	maksavauriot

3. Lääkkeitä, joilla **VOI OLLA YHTEISVAIKUTUKSIA** alkoholin kanssa

LÄÄKEAINE- RYHMÄ	VAIKUTTAVA AINE (esim.)	KAUPPANIMI (esim.)	HAITTA- VAIKUTUKSET
Tulehduskipu- lääkkeet	ibuprofeeni, ketopro- feeni, aspiriini (asetyy- lialisylihappona)	Burana, Ibumax, Ketorin, Aspirin	ruoansulatuskanavan vauriot
Mieliala- ja psykyen- lääkkeet	amitriptyliini, klomipramiini, nortriptyliini, ketiapiini	Triptyl Anafranil, Noritren, Ketipinor	alkoholi voi pahentaa ma- sennus ja mielialaoireita, alkoholin vaikutus voi tehostua, väsymyys, pi- toisuusmuutokset, maksa- vaurio, koordinaatiohäiriöt
Närästys- lääkkeet	ranitidiini	Zantac, Ranixal	alkoholin vaikutus te- hostuu, alkoholi ärsyttää ruoansulatuskanavaa
Verenhennus- lääke	varfariini	Marevan	varfariinin teho muuttuu (verenvuotoja, veritulppia)
Verenpaine- lääkkeet			muutokset veren- paineessa
Antibiootit			pääsääntöisesti ei yhteisvaikutuksia (poikkeus: ks. taulukko 1)

HUOMIOITAVAA

Nämä vaikutukset ovat suuntaa-antavia. Yksilölliset erot vaikutuksissa ja haitoissa ovat suuria. Jos käytät jotain lääkkeitä, suosittelemme keskustelemaan alkoholin-käytöstä ensin lääkärin kanssa.

